



راهنمای پرستاری

داروهای مصرفی در بیماران دیالیزی

❖ اپرکس یا اریتروپویتین

- نگهداری و مراقبت خاص از این دارو توسط استفاده کنندگان الزامیست. موارد زیر را بخاطر بسپارید:
- ✓ مواردی چون تغییر شدید دما، مجاورت طولانی با نور و تکان‌های شدید ویال و سرنگ محتوی دارو، بر عملکرد دارو اثر می‌گذارند.
- ✓ پس از خرید دارو از قرار دادن آن در مجاورت نور خورشید مقابل پنجره، شیشه اتومبیل یا هر منبع گرمایی دیگر خودداری نمایید زیرا دمای این دارو ممکن است به سرعت بالا رود.
- ✓ از حمل دارو در اتومبیلی که دمای داخل آن بیش از ۲۵ درجه سانتی‌گراد باشد خودداری نمایید.
- ✓ از تکان دادن شدید آمپول یا شیشه دارو حتی هنگامی که دارو در جعبه خود قرار دارد، جدا خودداری نمایید.
- ✓ سریعاً دارو را در یخچال با دمای ۸-۲ درجه سانتی‌گراد قرار دهید.
- ✓ از قرار دادن دارو در فریزر جدا خودداری نمایید.
- ✓ تا زمانی که از دارو استفاده نکرده‌اید آن را در یخچال درون جعبه مقوایی خود نگه دارید.
- ✓ جهت تاثیر بهتر دارو، قرص ب‌کمپکس و اسید فولیک را روزانه مصرف نمایید.
- ✓ در نظر داشته باشید که یکی از عوارض مهم داروی اریتروپویتین افزایش فشار خون است لذا مراقب فشار خون خود باشید و مرتب فشار خون خود را کنترل کنید.
- ✓ با درمان کم خونی و بهتر شدن اشتها مراقب افزایش وزن و افزایش سمومی: مانند اوره و پتاسیم باشید.
- ✓ ممکن است در حین درمان با اریتروپویتین نیاز به هپارین بیشتری ضمن دیالیز داشته باشید لذا فیستول خود را کنترل نمایید و هرگونه تغییر را گزارش کنید.
- ✓ پیش از برداشتن دارو از یخچال دست‌ها را به خوبی با آب و صابون شسته و با حوله تمیز خشک کنید.
- ✓ بعد از خارج کردن دارو از یخچال مطمئن شوید که تاریخ مصرف آن نگذشته باشد.
- ✓ صبر کنید تا دمای دارو با دمای اطاق یکسان شود در این مدت دارو باید دور از هر نوع منبع نوری یا گرما باشد. این فرآیند هم‌دما شدن حدود ۳۰-۱۵ دقیقه طول خواهد کشید.
- ✓ دارو نباید بیش از ۶۰ دقیقه در دمای اطاق نگه داشته شود.
- ✓ از گرم کردن دارو با استفاده از مالش شدید در میان کف دو دست، مایکروویو، فر معمولی و آب گرم خودداری نمایید.
- ✓ در نظر داشته باشید که دارو معمولاً باید شفاف و بدون رنگ باشد.
- ✓ در صورت مشاهده کدورت، رنگی شدن، ذرات معلق یا کف در دارو از مصرف آن اجتناب کنید.
- ✓ در صورت خراب شدن دارو در اثر خاموش شدن یخچال به علت قطع برق یا خرابی و یخ زدن یا گرم شدن دارو در حرارت بیش از ۲۵ درجه سانتی‌گراد از مصرف آن خودداری کنید.

❖ ونوفر

- موارد زیر را در زمان استفاده از این دارو بخاطر بسپارید:
- ✓ ونوفر و آمپول ویتامین ث (C) با توجه به نیاز هر بیمار توسط پزشک حین دیالیز تزریق می‌شوند.
- ✓ از مصرف خودسرانه ونوفر خودداری کنید.
- ✓ مصرف بیش از حد این دارو و یا سرعت بالای انفوزیون (تزریق) آن ممکن است باعث کاهش فشار خون، سردرد، تهوع، گیجی، درد مفاصل، بی حسی بدن، درد شکم، درد عضلات و ادم گردد. در صورت بروز این نشانه‌ها به پرستار اطلاع دهید.
- ✓ توجه داشته باشید این دارو با سایر داروها و یا محلول‌های تغذیه وریدی نباید مخلوط شود.



راهنمای پرستاری

داروهای مصرفی در بیماران دیالیزی

✓ توجه داشته باشید تعیین میزان مناسب دارو در سالمندان به علت کاهش عملکرد قلب، وجود انواع بیماری‌های زمینه‌ای و مصرف انواع داروها باید با احتیاط کامل و با مشورت پزشک مربوطه انجام گیرد.

❖ کربنات کلسیم

موارد زیر را در زمان استفاده از این دارو بخاطر بسپارید:

✓ در صورت بروز علائم بی‌اشتهایی، تهوع، یبوست، دل درد، خشکی دهان یا احساس تشنگی با پزشک مشورت نمایید.

✓ دارو را در دمای ۳۰-۱۵ درجه سانتی‌گراد و در پوشش بسته‌بندی شده خودش نگهداری کنید.

✓ این قرص را در ابتدا و یا بین غذا مصرف کنید.

❖ ویتامین دی (D)

✓ به صورت دوره‌ای و با نظر پزشک آزمایش کلسیم و فسفر خون را انجام دهید.

✓ دارو را دور از نور و حرارت نگهداری کنید.

❖ داروهای فشار خون و انسولین

عارضه اصلی افزایش فشار خون و دیابت، نارسایی کلیه‌ها می‌باشد. لذا اغلب بیماران دیالیزی از داروهای کاهش دهنده فشار خون و قند استفاده می‌نمایند.

✓ کلیه داروها را باید طبق دستور و منظم مصرف کنید.

✓ از قطع ناگهانی دارو پرهیز کنید.

✓ اگر در حین دیالیز دچار افت فشار خون یا قند می‌شوید، فقط وعده دارویی قبل از دیالیز را مصرف نکنید.

❖ نکات کلی در مصرف داروها

✓ کلیه داروها، حتی داروهایی را که پزشکان برای شما تجویز می‌کنند، باید با اطلاع پزشک نفرولوژیست شما باشد.

✓ از مصرف هرگونه مسکن به خصوص متوکاربامول و باکلوفن تجویز پزشک معالجتان خودداری فرمایید.

✓ مصرف سایر ویتامین‌ها، را باید با نظر پزشک معالج مصرف کنید.

✓ داروها را در ساعت مشخص مصرف کنید.

✓ در صورتی که دارویی را فراموش نمودید و تا ساعت مصرف بعدی زمان زیادی دارید آن را مصرف کنید. ولی اگر به زمان مصرف بعدی نزدیک است از مصرف آن خودداری نمایید.

✓ داروها را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

✓ قرص‌های تاریخ مصرف گذشته را در منزل نگهداری نکنید.

✓ همیشه به میزان کافی داروهای مصرفی را در منزل داشته باشید و پیش از تمام شدن آن، دوباره نسخه را از داروخانه تهیه نمایید یا به پزشک مراجعه نمایید.

✓ اگر قصد سفر دارید، حتما مطمئن شوید که دارو به میزان کافی برای آن مدت به همراه دارید.

✓ در صورت مراجعه به هر پزشک دیگر، حتما پزشک را از مصرف داروها مطلع نمایید.

✓ خودسرانه و بدون مشورت با پزشک، داروهای مصرفی خود را قطع نکنید و یا آن‌ها را تغییر ندهید.

❖ زمان مراجعه بعدی

✓ در صورت مشاهده عوارض دارویی مانند بی‌اشتهایی، استفراغ، اسهال و ... به پزشک مراجعه نمایید.

✓ در صورت اتمام داروهای مصرفی و یا رسیدن زمان ویزیت پزشک مراجعه نمایید.