



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین بستری

عفونت ادراری در کودکان

همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار، الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص **عفونت ادراری در کودکان** طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد.

❖ رژیم غذایی

- ✓ از مایعات فراوان استفاده شود و مواد غذایی حاوی ویتامین ث (C) مصرف نمایند.
- ✓ در بیمارستان از غذاهای پر کالری و پرپروتئین استفاده می‌شود.

❖ فعالیت

- ✓ در مرحله حاد فعالیت کودک را محدود کنید.

❖ مراقبت

- ✓ بهداشت ناحیه تناسلی رعایت شود و بعد از هر بار ادرار کردن کودک شستشو و خشک شود.
- ✓ دادن آموزش به بچه‌ها درباره عادات صحیح دستشویی رفتن و رعایت بهداشت از جمله راه‌های پیشگیری این مشکل است پس کودکان خود را آموزش دهید تا یاد بگیرند که ادرارشان را برای مدت طولانی نگه ندارند.
- ✓ جهت کاهش تب لباس‌های اضافی کودک را خارج کنید.
- ✓ در صورت داشتن تب به روش صحیح با کمک و آموزش پرستار برای کودک بدنشویه انجام دهید.
- ✓ قبل و بعد از تعویض پوشک بچه و یا دفع ادرار بهداشت فردی بخصوص بهداشت دست رعایت شود.
- ✓ ادرار کودک را از نظر رنگ و بو و کدورت کنترل کرده و به پرستار اطلاع دهید.
- ✓ در صورت داشتن سوند ادراری کیسه ادرار را بالاتر از سطح بدن قرار ندهید زیرا ادرار آلوده وارد مثانه می‌شود و باعث عفونت مثانه می‌شود.
- ✓ کیسه تخلیه ادرار نباید با زمین تماس داشته باشد بهتر است بصورت قلاب‌هایی از لب تخت آویزان باشد.
- ✓ مراقب تا خوردن یا پیچ خوردن و بسته شدن لوله ادراری باشید. ادرار باید به راحتی در لوله جریان داشته باشد.
- ✓ از دستکاری سرم و رابط‌ها اجتناب شود.

❖ دارو

- ✓ دستورات دارویی (آنتی بیوتیک و سرم) طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار تجویز می‌شود.



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین ترخیص

عفونت ادراری در کودکان

❖ رژیم غذایی

- ✓ از مصرف محرک‌های دستگاه ادراری مانند قهوه، چای، ادویه و نوشابه‌های حاوی کولا پرهیز نمایید. سعی کنید مصرف نگهدارنده‌ها و افزودنی‌های غذایی را کاهش دهید.
- ✓ از ویتامین ث (C) بیشتر استفاده نمایید. (پرتقال و ...) و از مصرف نوشیدنی‌های شیرین و آب میوه‌های شیرین شده پرهیز کنید.
- ✓ از مصرف زیاد مواد غذایی تصفیه شده مانند نان سفید، پاستا و بویژه شکر اجتناب کنید.
- ✓ بیشتر از ماهی‌ها، سویا و لوبیاها به عنوان منبع پروتئین استفاده کنید.
- ✓ روغن‌های پخت و پز سالم مثل روغن زیتون استفاده کنید.
- ✓ توصیه می‌شود به طور کلی مواد غذایی غنی از آنتی اکسیدان‌ها، ویتامین‌ها و فیبر را استفاده کنید.

❖ فعالیت

- ✓ پس از مرحله حاد و کاهش تب کودک می‌تواند فعالیت‌های خود را از سر بگیرد.

❖ مراقبت

- ✓ عدم استفاده از وان هنگام استحمام و به جای آن از دوش استفاده شود.
- ✓ از مصرف فرآورده‌های بهداشتی مخصوص دستگاه تناسلی (اسپری یا پودر) و صابون‌های قوی خودداری کنید.
- ✓ لباس‌های زیر کودک را از نوع نخی انتخاب کنید و از جوراب شلوا‌هایی که قسمت بالای آن نخی است استفاده کنید.
- ✓ در شرایطی که کودک با لوله و یا سوند ادراری مرخص می‌شود لطفاً قبل و پس از دست زدن به لوله ادراری و کیسه تخلیه دست‌ها را بشوئید.
- ✓ برای جلوگیری از آلودگی، لوله ادراری را از کیسه تخلیه جدا نکنید.
- ✓ ادرار درون کیسه تخلیه را حداقل هر ۸ ساعت یکبار و یا در صورت زیاد بودن حجم ادرار با فواصل کمتر تخلیه کنید.
- ✓ لوله ادراری باید هر ۲ هفته یکبار تعویض شود و در صورت مستعد بودن کودک به عفونت مجاری ادراری طبق دستور پزشک تعویض گردد.
- ✓ تعویض یا در آوردن لوله ادراری باید توسط افراد با تجربه انجام شود تا از صدمه رسیدن به مجرای ادراری بیمار جلوگیری شود.
- ✓ از پوشاندن لباس زیر یا شلوار تنگ و چسبان به دختر بچه‌ها باید پرهیز کرد چرا که این مساله هم یکی از عوامل افزایش خطر عفونت است.
- ✓ بهترین راه‌ها برای پیشگیری از عفونت ادراری در پسر بچه‌ها ختنه است، به گفته متخصصان اگر پسرها قبل از یک سالگی ختنه شوند، به میزان زیادی از بروز عفونت ادراری در آنها جلوگیری می‌شود.
- ✓ دادن آموزش به بچه‌ها در باره عادات صحیح دستشویی رفتن و رعایت بهداشت از جمله راه‌های پیشگیری این مشکل است پس کودکان خود را آموزش دهید تا یاد بگیرند که ادرارشان را برای مدت طولانی نگه ندارند.
- ✓ توجه داشته باشید که اگر کودکی دچار عفونت ادراری شود و درمان نشود به کلیه‌های او آسیب وارد می‌شود و این کودک تا بزرگسالی از نظر فشارخون و دفع پروتئین در ادرار بایستی مورد بررسی قرار گیرد.
- ✓ عفونت ادراری همیشه با نشانه‌ها همراه نیست و تنها از طریق آزمایش ادرار قابل تشخیص است اما در کودکان زیر دو سال می‌تواند با علائمی چون تب، بی‌قراری، بوی بد ادرار، درد شکم، بی‌حالی و خوب شیر نخوردن و وزن نگرفتن همراه باشد.
- ✓ در مدت زمان مشخص شده توسط پزشک بعد از درمان باید آزمایش ادرار را تکرار کنید تا مشخص شود که عفونت برطرف شده است.

❖ دارو

- ✓ طول دوره درمان عفونت ادراری نسبتاً زیاد و بین ۱۰ روز تا ۲ هفته است و مصرف آنتی بیوتیک را کامل و از مصرف خودسرانه دارو جدا پرهیز کنید.

❖ زمان مراجعه بعدی

- ✓ نکته مهم در مورد درمان عفونت ادراری در کودکان آن است که وقتی درمان به پایان رسید حتماً باید پیگیری‌های لازم انجام شود تا علت اصلی عفونت ادراری روشن شود.
- ✓ در موقع بروز علائم به صورت تکرار ادرار، سوزش، بی‌اختیاری ادرار، زور زدن هنگام ادرار، بوی بد ادرار و در مواردی معمولاً وجود تب (معمولاً خفیف و کمتر از یک درجه) و بروز ضعف، تهوع، استفراغ و کاهش برون ده ادراری و در کودکان زیر یک سال توقف رشد کودک به پزشک مراجعه نمائید.