



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین بستری

عفونت ادراری در بزرگسالان

همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار، الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص **عفونت ادراری** در **بزرگسالان** طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد.

❖ تغذیه

- ✓ روزانه حداقل ۸-۶ لیوان آب بنوشید.
- ✓ آب میوه تازه حاوی ویتامین ث (C) استفاده نمایید و از نوشیدن نوشیدنی‌های شیرین و آب میوه‌های شیرین پرهیز کنید.

❖ فعالیت

- ✓ در صورت داشتن تب و عدم تحمل فعالیت تا سپری شدن دوره حاد بیماری فعالیت خود را محدود کنید.

❖ مراقبت

- ✓ از دستکاری سرم و رابط‌ها اجتناب کنید.
- ✓ دستورات دارویی طبق تجویز پزشک در فواصل مشخص توسط پرستار برای شما اجرا می‌شود.
- ✓ ادرار خود را از نظر رنگ و بو و کدورت کنترل کرده و به پرستار اطلاع دهید.
- ✓ هیچگاه احساس دفع ادرار را نادیده نگیرید و سعی کنید هر بار مثانه را کاملاً خالی کنید.
- ✓ لباس‌های زیر خود را از نوع نخی انتخاب کنید و از جوراب شلواری‌هایی که قسمت بالای آن نخی است استفاده کنید.
- ✓ در صورت داشتن سوند ادراری کیسه ادرار را بالاتر از سطح بدن قرار ندهید زیرا ادرار آلوده وارد مثانه می‌شود و باعث عفونت مثانه می‌شود.
- ✓ کیسه تخلیه ادرار نباید با زمین تماس داشته باشد بهتر است بصورت قلاب‌هایی از لب تخت آویزان باشد.
- ✓ مراقب تا خوردن یا پیچ خوردن و بسته شدن لوله ادراری باشید. ادرار باید به راحتی در لوله جریان داشته باشد.



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین ترخیص

عفونت ادراری در بزرگسالان

❖ رژیم غذایی

- ✓ در طول روز زیاد مایعات بنوشید و از مصرف نوشیدنی‌های شیرین و آب میوه‌های شیرین پرهیز کنید و میزان توصیه شده ۸-۶ لیوان آب تصفیه شده در روز است.
- ✓ سعی کنید مصرف آلرژن‌ها، نگهدارنده‌ها و افزودنی‌های غذایی را کاهش دهید.
- ✓ به جای گوشت قرمز، ماهی و سویا و لوبیاها را به عنوان منبع پروتئین مصرف کنید.
- ✓ مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان مثل میوه‌هایی چون زغال اخته، گیلاس و سبزیجاتی مانند کدو حلوائی و گوجه فرنگی را بیشتر مصرف کنید.
- ✓ مواد غذایی حاوی فیبر مثل لوبیا، جو، ریشه سبزیجات مثل سیب زمینی و دانه پسیلیوم (دانه گیاه اسفرزه) را بیشتر مصرف کنید.
- ✓ از مصرف زیاد مواد غذایی تصفیه شده مانند نان سفید، پاستا و به ویژه شکر اجتناب کنید.
- ✓ روغن‌های پخت و پز سالم مثل روغن زیتون یا روغن سبزیجات را مصرف نمایید.
- ✓ مصرف اسیدهای چرب ترانس را در رژیم غذایی خود کاهش دهید یا در صورت امکان آنها را حذف کنید: این نوع اسیدهای چرب معمولاً در مواد غذایی پخته شده در صنایع غذایی مثل کلوچه‌ها، بیسکویت‌های خشک نمکی، سیب زمینی سرخ کرده، مواد غذایی فرآوری شده و مارگارین وجود دارند.
- ✓ از مصرف قهوه و سایر محرک‌ها مانند الکل و تنباکو، چای غلیظ پرهیز نمایید. (الکل و کافئین با تحریک مثانه احتمال ابتلا به عفونت را افزایش می‌دهند)
- ✓ اجتناب از مصرف محرک‌هایی مثل سرکه و ادویه‌جات.

❖ فعالیت

- ✓ پس از بهبود علائم حاد بیماری و افزایش قدرت جسمانی فعالیت‌های خود را افزایش دهید و در برنامه‌ریزی روزانه ورزش‌های ملایم به همراه دوره‌های استراحت بگنجانید.
- ✓ حداقل ۳۰ دقیقه و ۵ بار در هفته ورزش کنید.

❖ مراقبت

- ✓ رعایت بهداشت فردی بویژه پس از اجابت مزاج و تعویض مرتب لباس زیر ضروری است.
- ✓ هیچ‌گاه ادرار کردن را به تاخیر نیندازید.
- ✓ همیشه به درستی خودتان را تمیز کنید و از جلو به سمت عقب خود را بشویید تا باکتری‌ها وارد دستگاه ادراری نشوند. از اسپری و یا عطر زنانه در دستگاه تناسلی استفاده نکنید.
- ✓ از پوشیدن لباس‌های تنگ و شورت‌های نایلونی برای مدت طولانی خودداری کنید.
- ✓ پیش از مقاربت جنسی و بعد از آن ادرار کنید و دستگاه تناسلی را با آب و صابون ملایم بشوئید.
- ✓ از فرآورده‌های بهداشتی مخصوص دستگاه تناسلی (اسپری یا پودر) و صابون‌های قوی خودداری کنید.
- ✓ عدم استفاده از وان هنگام استحمام کردن.
- ✓ در زمان مشخص شده توسط پزشک اگر نیاز باشد بعد از درمان باید آزمایش ادرار را تکرار کنید تا مشخص شود که عفونت برطرف شده است. انجام کشت‌های مکرر ادرار با فواصل معین در تمام دوره بارداری امری الزامی است تا از عدم بازگشت عفونت اطمینان حاصل شود.
- ✓ در شرایط خاصی که شما با لوله و یا سوند ادراری مرخص می‌شوید. لطفاً قبل و پس از دست زدن به لوله ادرای و کیسه تخلیه دست‌ها را بشوئید.
- ✓ برای جلوگیری از آلودگی لوله ادرای را از کیسه تخلیه جدا نکنید.
- ✓ ادرار درون کیسه تخلیه را حداقل هر ۸ ساعت یکبار و یا در صورت زیاد بودن حجم ادرار با فواصل کمتر تخلیه کنید.
- ✓ از دست کاری لوله و کیسه تخلیه خودداری کنید.
- ✓ لازم به ذکر است که تعویض یا در آوردن لوله ادراری باید توسط افراد با تجربه انجام شود تا از صدمه رسیدن به مجرای ادرای بیمار جلوگیری شود.

❖ دارو

- ✓ در صورت تجویز آنتی بیوتیک به مدت کافی دوره درمان را کامل کنید. (بسیاری از آنتی بیوتیک‌ها را می‌توان با اطمینان در دوران بارداری مصرف کرد با تایید و نظر پزشک)

❖ زمان مراجعه بعدی

- ✓ مراقب علائم اولیه عفونت‌ها باشید.
- ✓ در صورت وجود خون در ادرار، ادرار کدر، تب و لرز و وجود خون و ترشحات چرکی در ادرار به پزشک مراجعه نمایید.