



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین بستری

فارنژیت

همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خود مراقبتی و آموزش بیمار، الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص
فارنژیت طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد.

❖ درمان

- ✓ در صورتیکه منبع بیماری باکتریایی یا قارچی باشد از درمان با آنتی بیوتیک ها و یا داروهای ضدقارچ استفاده می کنند.
- ✓ در صورتیکه منبع بیماری ویروسی باشد درمان بسته به نوع ویروس متفاوت است پزشک جهت درمان مناسب تصمیم گیری لازم را انجام می دهد.
- ✓ زمانی که علائم بیماری شدید و غیر قابل کنترل در منزل باشد بیمار در بیمارستان بستری می شود.

❖ فعالیت

- ✓ بهتر است در تخت استراحت کنید.
- ✓ در بستر انگشتان و مچ پاهای سالم را حرکت دهید، تا از لخته شدن خون در پاها پیشگیری شود.
- ✓ در صورت اجازه پزشک برای خروج از تخت ابتدا نشسته و سپس پاهای خود را از لبه تخت آویزان نمایید و در صورت نداشتن سرگیجه با کمک همراه خود و یا پرستار از تخت خارج شوید.

❖ مراقبت

- ✓ در صورت داشتن درد، به پرستار اطلاع داده تا طبق تجویز پزشک اقدامات لازم جهت تسکین درد شما را انجام دهد.
- ✓ از دستکاری سرم ها و رابط های متصل به خود خودداری کنید.
- ✓ مکرراً دست های خود را بشویید.
- ✓ از مصرف خودسرانه دارو بغیر از داروهای تجویز شده و بدون اجازه پزشک خودداری کنید.
- ✓ داروها طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار برای شما اجرا خواهد شد.
- ✓ اگر همراه دارید از او بخواهید که ماسک بزند و بیشتر وقت خود را در خارج از اتاق بستری شما بگذرانند.
- ✓ مایعات فراوان بنوشید.
- ✓ از خانواده خود بخواهید کمتر به ملاقات شما بیایند.
- ✓ در صورت مشاهده دانه های پوستی ناشی از مصرف دارو به پزشک یا پرستار خود اطلاع دهید.



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین ترخیص

فارنژیت

❖ تغذیه

- ✓ برای کمک به تسکین گلو درد سوپ مرغ و سبزیجات بخورید.
- ✓ مایعات فراوان بنوشید. روزانه حداقل ۸ لیوان آب بنوشید، و در موارد تب بالاتر بیشتر بنوشید.
- ✓ اگر بلع غذا ها جامد باعث درد می شود تا چند روز از رژیم غذایی نرم و فاقد مواد محرک نظیر ادویه استفاده کنید.

❖ فعالیت

- ✓ محدود کردن فعالیت ها تا برطرف شدن علائم لازم است.
- ✓ اگر کارمند هستید، مرخصی گرفته و یکی دو روز در منزل استراحت کنید. خستگی در زمان بیماری نه تنها موجب تشدید بیماری خواهد شد، بلکه رفتن شما به محل کار ممکن است موجب بیمار شدن همکاران شما هم بشود.

❖ مراقبت

- ✓ در صورت تورم دردناک غدد لنفاوی گردن، از کمپرس با آب گرم حداقل ۴ بار در روز هر بار ۳۰-۲۰ دقیقه استفاده کنید. اگر در طی این عمل، گرمای کمپرس حفظ گردد مؤثرتر خواهد بود. مواظب باشید پوست خود را نسوزانید.
- ✓ از کشیدن سیگار یا سایر دخانیات خودداری نمایید.
- ✓ از قرار گرفتن در معرض دود سیگار یا دخانیات و یا گازهایی که بر اثر پاک کننده های خانگی (مثل سفیدکننده یا جرم گیرها خودداری نمایید.
- ✓ غرغره چای غلیظ گرم یا سرد، یا محلول آب نمک (یک قاشق چایخوری نمک در ۲۵۰ سی سی آب گرم (معادل یک بطری کوچک نوشابه). غرغره کردن را هر چند نوبت که می خواهید انجام دهید.
- ✓ از یک دستگاه مرطوب کننده با بخار سرد برای مرطوب کردن هوای اتاق استفاده کنید. این کار احساس خشکی و گرفتگی گلو را تخفیف می دهد. آب دستگاه بخور را هر روز عوض کنید و حداقل هر ۳ روز یک بار آن را بشویید. تا برطرف شدن عفونت از استفاده حوله یا غذای مشترک اجتناب کنید.
- ✓ مسواک خود را عوض کنید. میکروب های عامل عفونت ممکن است در لابه لای پرزهای آن مستقر گردد.
- ✓ جهت کنترل تب و درد از استامینوفن با نظر پزشک استفاده کنید. از دادن آسپیرین به کودکان برای هرگونه بیماری ویروسی خودداری کنید.
- ✓ دوره درمان آنتی بیوتیک را حتماً به پایان برسانید. از قطع داروها بدون اجازه پزشک خودداری نمایید.
- ✓ برخی معتقدند که درمان های گیاهی کاملاً بی خطر هستند و از هر گیاهی و به هر میزانی می شود استفاده کرد. توجه داشته باشید گیاهان، داروهای بی خطری نیستند و نباید در مصرف آن ها دچار افراط شد.
- ✓ تا بهبودی کامل و یا حداقل ۴۸ ساعت پس از مصرف آنتی بیوتیک مناسب زمان صحبت، عطسه یا سرفه جلوی دهان و بینی خود را با دستمال تمیز بپوشانید.
- ✓ موقع صحبت با افراد سالم در مقابل صورت آنها قرار نگیرند و بهتر است زاویه دو صورت ۹۰ درجه باشد. رعایت حداقل فاصله ۱ متری الزامی است.
- ✓ جرعه جرعه نوشیدن آب طی روز مانع از خشکی گلو می شود
- ✓ از غسل و لیمو ترش استفاده کنید. یک قاشق عسل و آب یک عدد لیمو ترش را در یک لیوان آب داغ حل کنید و بگذارید در دمای اتاق سرد شود و سپس آن را جرعه جرعه بنوشید. عسل درد گلو را تسکین داده و لیمو به کاهش خلط کمک می کند.
- ✓ آب نبات بمکید. این کار به خودی خود آرام بخش نیست، اما با تحریک بزاق موجب شست و شو و تمیز شدن حلق می شود.
- ✓ اگر گلو درد موجب تغییر صدای شما شده، به این معنی است که تارهای صوتی شما بر اثر التهاب آسیب دیده اند؛ بنابر این صحبت کردن برای شما خوب نیست و ممکن است باعث قطع صدای شما شود.
- ✓ آسان ترین و بهترین راه پیشگیری از بیماری، شستن مرتب و دقیق دست ها با آب و صابون است؛ به طوری که مالیدن دست ها به همدیگر حداقل ۱۵ ثانیه طول بکشد. اگر آب و صابون در دسترس نبود، می توانید از ژل های ضد عفونی کننده و میکروب کش استفاده کنید.
- ✓ از تماس دهان خود با گوشی های تلفن و شیر آب سردکن ها خودداری کنید.

❖ زمان مراجعه بعدی

- ✓ اگر علائم فارنژیت بیشتر از یک هفته با وجود انجام درمان طول کشید.
- ✓ در صورت مشاهده علائم اختلال بلع یا تنفس، تب، سردرد شدید، ترشحات غلیظ بینی، بثورات پوستی، ادرار تیره رنگ، درد قفسه سینه، سرفه همراه با خلط سبز، زرد، قهوه ای یا خونی