



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین بستری

فشار خون دوران بارداری

همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار، الزامی است آموزش بیمار حین بستری و تریخیص **فشار خون دوران بارداری** طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد.

❖ فعالیت

- ✓ بهتر است در تخت استراحت نمایید.
- ✓ در بستر انگشتان و مچ پاها را حرکت دهید، تا از لخته شدن خون در پاها پیشگیری شود.
- ✓ در صورت اجازه پزشک برای خروج از تخت ابتدا نشسته و سپس پایهای خود را از لبه تخت آویزان نمایید و در صورت نداشتن سرگیجه با کمک همراه خود و یا پرستار از تخت خارج شوید.
- ✓ از بلند شدن ناگهانی و خارج شدن از تخت بدون هماهنگی با پرستار و همراهان خودداری کنید.

❖ تغذیه

- ✓ از رژیم غذایی که متخصص تغذیه یا کارشناس تغذیه برای شما در نظر گرفته است استفاده نمایید.
- ✓ از خوردن غذاهای شور و یا اضافه کردن نمک به غذای خود پرهیز نمایید.

❖ درمان

- ✓ مهم‌ترین نکته در درمان فشارخون بالا در بارداری تشخیص زود هنگام و نوع فشارخون است.
- ✓ اگر در هفته ۳۷ بارداری افزایش فشارخون خفیف مشاهده شد، ممکن است به مدت چند هفته در بیمارستان بستری شوید تا تحت نظر قرار گیرید.
- ✓ در صورت فشارخون ۱۶۰/۱۱۰ یا بیشتر درمان دارویی قرار خواهید گرفت تا فشارخون پائین آید و تا زمان تولد نوزاد بستری خواهید شد.
- ✓ اگر در هفته ۳۴ بارداری یا بعد از آن قرار داشته باشید، زایمان انجام می‌شود.
- ✓ اگر هنوز به هفته ۳۴ بارداری نرسیده‌اید به شما دارو داده می‌شود تا تکامل ریه‌ها و سایر اعضای بدن جنین انجام گردد.
- ✓ در صورت شک به احتمال ایجاد پره اکلامپسی دارهای ضد تشنج تجویز خواهد شد.
- ✓ عدم مصرف مسکن و آرام بخش.

❖ مراقبت

- ✓ از دستکاری سرم‌ها و اتصالات خود اجتناب نمایید.
- ✓ با تیم درمانی همکاری لازم را داشته باشید.
- ✓ از مصرف دارو بدون تجویز پزشک و خودسرانه خودداری نمایید.
- ✓ داروها در فواصل مشخص توسط پرستار برای شما اجرا خواهد شد.



دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین ترخیص

فشارخون دوران بارداری

❖ رژیم غذایی

- ✓ از همان ابتدای بارداری بر میزان مصرف نمک خود دقت کرده و آن را کنترل کنید.
- ✓ در زمان پخت غذا بجای نمک از گیاهان و ادویه‌های مختلف برای طعم‌دار کردن غذا استفاده نمایید.
- ✓ از غذاهای فراوری شده، فست فودها و نوشابه‌های گازدار که دارای سدیم بالا هستند؛ اجتناب کنید.
- ✓ از مصرف غذاهای کنسرو شده که اغلب دارای مقادیر بالای سدیم هستند اجتناب کنید.
- ✓ از رژیم غذایی متشکل از چربی‌های سالم، پروتئین، ویتامین و مواد معدنی استفاده نمایید.
- ✓ افزایش پتاسیم مصرفی می‌تواند تاثیر سدیم بر فشارخون را کاهش دهد. از بهترین غذاهای غنی از پتاسیم عبارتند از: سیب زمینی شیرین، گوجه فرنگی، آب پرتقال، سیب زمینی، موز، لوبیا، نخود فرنگی، طالبی، هندوانه و میوه‌های خشک مانند آلو و کشمش. در مورد میزان مناسب پتاسیم برای خود با پزشکتان مشورت کنید.
- ✓ مصرف مقدار کافی منیزیم به صورت روزانه، موجب کاهش فشارخون می‌گردد. منیزیم در موادی مثل بادام، آووکادو، موز، لوبیا، دانه کدو تنبل، توفو، شیر سویا، سیب زمینی (با پوست)، ماست، غلات کامل و سبزیجات برگ سبز، فراوان است.
- ✓ جهت جلوگیری از یبوست رژیم غذایی پرفیبر و مایعات مصرف کنید.
- ✓ از مصرف غذاهای نفاخ و دیر هضم اجتناب کنید.
- ✓ یک برنامه غذایی سالم و مناسب داشته باشید و از مصرف غذاهای پر کالری و با ارزش غذایی کم خودداری کنید.
- ✓ مراقب میزان مصرف کافئین خود باشید. مصرف کافئین در دوران بارداری موجب کاهش جریان خون جفت می‌شود و با خطر سقط جنین در ارتباط است.

❖ فعالیت

- ✓ یکی از مهم‌ترین اقدامات درمانی استراحت است ولی نیازی به استراحت مطلق نیست.
- ✓ در صورت اجازه پزشک معالج در طول روز با ۳۰ تا ۴۵ دقیقه پیاده‌روی، فشارخون خود را کنترل کنید.

❖ مراقبت

- ✓ از توقف دارو بدون مشورت با دکتر پرهیز کنید
- ✓ از مصرف دخانیات (سیگار) و نوشیدن الکل، خودداری نمایید.
- ✓ حرکات جنین را در هر روز بشمارید. این روش برای کنترل سلامت جنین در فواصل معاینات پیش از زایمان بسیار عمل مناسبی است.
- ✓ به طور مرتب فشارخون خود را کنترل نمایید.
- ✓ داروهای تجویز شده توسط پزشک معالج خود را سر وقت مصرف نمایید. از قطع دارو بدون اجازه پزشک اجتناب نمایید.
- ✓ گوش دادن به نوع مناسب از موسیقی برای حداقل ۳۰ دقیقه، ۲ یا ۳ بار در روز، می‌تواند فشارخون خود را کاهش دهد.

❖ زمان مراجعه بعدی

- ✓ در صورت مشاهده علائم زیر سریع به پزشک معالج خود مراجعه نمایید:
- ✓ در صورتی که تعداد حرکات جنین کمتر از قبل شده است.
- ✓ در صورتی که فشارخون از ۱۴۰/۹۰ بالاتر باشد.
- ✓ در صورت بروز علائم پره کلامپسی مانند ورم، افزایش ناگهانی وزن، سردرد مداوم یا شدید، تغییرات دید، درد بالای شکم و یا حساسیت آن ناحیه و یا تهوع و استفراغ.
- ✓ در صورت بروز علائم پارگی جفت مانند لکه بینی یا خونریزی و درد و حساس شدن رحم در لمس.